

UNIVERSITÉ DE PARIS - FACULTE DE MEDECINE

ANNÉE 1953

N°

600

THÈSE

POUR LE

DOCTORAT EN MEDECINE

(DIPLOME D'ÉTAT)

PAR


LISE PLATEAU

Née le 23 Mai 1924 à CUMIÈRES (Marne)

Présentée et soutenue publiquement le 25 Juin 1953

ESSAI SUR LE CORYZA

Président de Thèse : Monsieur AUBIN (Professeur)



1953

UNIVERSITE DE PARIS - FACULTE DE MEDECINE

-:-:-:-:-:-:-:-

ANNEE 1953

N°

T H E S E

pour le

DOCTORAT EN MEDECINE

(diplôme d'Etat)

par

Lise PLATEAU

Née le 23 mai 1924 à CUMIERES (Maine) -

-:-

Présentée et soutenue publiquement le

-:-

ESSAI SUR LE CORYZA

-:-

Président de Thèse : Monsieur AUBIN (Professeur).



M. BAUDOUIN

PROFESSEURS HONORAIRES :

MM. BAUDOUIN, BRINDEAU, CARNOT, CHEVASSU, CHIRAY, CLERC, DELBET, GOUGEROT, GUILLAIN, HARTMANN, LAIGNEL-LAVASTINE, LAUBRY, LEMAITRE, MEMIERRE, LHERMITTE, LOEPER, MARION, MATHIEU, MULON, OMBREDANNE, ROUVIERE, SANNIE, SEZARY, SEBILEAU, TANON.

DOYEN _____ Léon BINET
Membre de l'INSTITUT

ASSEESSEUR _____ Jean VERNE

I.- PROFESSEURS

	MM.
Anatomie _____	OLIVIER (E)
Anatomie pathologique _____	DELARUE (R)
Bactériologie _____	GASTINEL (P)
Biologie médicale _____	VERNE (J)
Cancérologie médicale et sociale _____	HUGUENIN (R)
Carcinologie _____	OBERLING (C)
Chimie médicale _____	POLONOVSKI (M)
(Hôtel Dieu _____)	BROCQ (P)
(St Antoine _____)	CADENAT (F)
Cliniques chirurgicales (Salpêtrière _____)	MONDOR (H)
(Cochin _____)	CHENU (J)
Clinique chirurgicale réparatrice et orthopédique _____	MERLE d'AUBIGNE (R)
Clinique de cardiologie _____	DONZELOT (E)
Clinique de chirurgie infantile et d'orthopédie _____	FEVRE (M)
Clinique de chirurgie pleuro-pulmonaire _____	MONOD (R)
Clinique de la tuberculose _____	BERNARD (E)
Clinique de neuro-chirurgie _____	PETIT DUTAILLIS (D)
Clinique de puériculture _____	LELONG (M)
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques _____	DEGOS
Clinique des maladies du sang _____	CHEVALLIER (P)
Clinique des maladies du système nerveux _____	ALAJOUANINE (T)
Clinique des maladies des enfants _____	DEBRE (R)
Clinique des maladies infectieuses _____	MOLLARET (F)
Clinique des maladies mentales et de l'encéphale _____	DELAY (J)
Clinique gynécologique _____	FUNCK BRENTANO (P)
(Hôtel Dieu _____)	BENARD (H)
Cliniques médicales (Bichat _____)	LAROCHE (G)
(Cochin _____)	MOREAU
(Pitié _____)	LIAN (C)
Clinique médicale d'hydro-climatologie théra- peutique _____	JUSTIN BESANÇON (L)
Clinique médicale propédeutique _____	PASTEUR VALLERY-RADOT
(Tarnier _____)	LANTUEJOUL (P)
Cliniques obstétricales (Baudelocque _____)	LEVY-SOLAL (E)
(Port-Royal _____)	LACOMME
Clinique ophtalmologique _____	VELTER (E)
Clinique Oto-rhino-laryngologique _____	AUBIN
Clinique physio-pathologique des problèmes ali- mentaires _____	RICHEL (C)
(chaire à titre personnel)	
Clinique psychiatrique infantile _____	HEUYER (C)

Clinique rhumatologique	COSTE (F)
Clinique stomatologique	DECHAUME (M)
Clinique thérapeutique chirurgicale	SENEQUE (J)
Clinique thérapeutique médicale	CHABROL (E)
Clinique urologique	FEY (B)
Embryologie	GIROUD (A)
Histoire de la médecine et de la chirurgie	MOUQUIN
Histologie	CHAMPY (C)
Hygiène et clinique de la première enfance	CATHALA (J)
Hygiène et médecine préventive	JOANNON (C)
Médecine du travail	DESOILLE (H)
Médecine légale	PIEDELIEVRE (R)
Parasitologie et histoire naturelle médicale	GAILLIARD (H)
Pathologie chirurgicale	de GAUDART d'ALLAINES (F)
Pathologie exotique	LAVIER (G)
Pathologie expérimentale et comparée	LEMAIRE (A)
Pathologie médicale	BARIETY
Pathologie et thérapeutique générales	de GENNES (L)
Pharmacologie et matière médicale	HAZARD (R)
PHYSIOLOGIE	BINET (L)
Physique médicale	STROHL (A)
Radiologie médicale	DESGREZ (H)
Technique chirurgicale	MOULONGUET (P)
Thérapeutique	TURPIN (R)

II.- PROFESSEURS SANS CHAIRE

MAITRES DE CONFERENCES-AGREGES et AGREGES

	MM.
Anatomie	(CORDIER (JC) Pr.s.ch. (DEBEYRE (J) (DELMAS (A)
Anatomie pathologique	(GAUTHIER-VILLARS (Melle P) Pr.s.ch. (BUSSE (F)
Bactériologie	(FASQUELLE (R)
Biologie médicale	(NEVOT (A) (BOURLIERE (F)
Chimie médicale	(ETTORI (J) Pr s ch (JAYLE (M F) pr s ch (SCHAPIRA (G)
Dermato-syphiligraphie	N (BULLIARD (H) Pr s ch
Histologie	(COUJARD (R) (DESCLAUX (P)
Hydrologie	DEBRAY (C) (BOYER (J)
Hygiène	(DEPARIS (M) (DEROBERT (L)
Médecine légale	(GAULTIER (J)
Neurochirurgie	N
Neurologie	SEZE (S de)

	(GRASSET (J)
	(LEPAGE (F)
	(MAYER (M)
Obstétrique	(MERGER (R)
	(RAVINA (J)
	(VARANGOT (J)
	(OFFRET (G)
Ophthalmologie	(DESVIGNES (P)
	(HALPHEN (E) Pr s ch
Oto-rhino-laryngologie	(MADURO (R)
Parasitologie	(BRUMPT (L)
Parasitologie coloniale	(CHABAUD ff.
	(ABOULKER (P)
Pathologie chirurgicale	(BAUMANN (J)
	(GOSSET (J)
(	(HUGUIER (J)
	(LAURENCE (G)
	(LEGER (L)
	(OLIVIER (Cl)
Pathologie chirurgicale	(PADOVANI (P)
	(POILLEUX (M)
	(ROUX (M)
	(RUDLER (J C)
	(VERNE (J M)
Pathologie expérimentale	(MERKLEN (P)
	(BERNARD (J)
	(BOUDIN (G)
	(CASTAIGNE (P)
	(CONTE (M)
	(DECOURT (J)
	(DOMART (A)
Pathologie médicale	(DREYFUS (Gilbert)
	(FAUVERT (R)
	(HAMBURGER (J)
	(KOURILSKY (R)
	(LAMY (M)
	(MAURIC (G)
	(MILLIEZ (P)
	(PERRAULT (M)
Pathologie médicale	(RAMBERT (P)
	(THIEFFRY (St)
	(TURIAF (J)
	(LAPLANE (R)
Pédiatrie	(MARIE (J)
	(LEVY (Melle J) Pr s ch
Pharmacologie	(CHEYMOL (J H)
	(Bargeton (D)
Physiologie	(PARROT (J L)
	(DOGNON (A) Pr s ch
Physique médicale	(DJOURNO (A)
	(GOUGER
Psychiatrie	(BARUK (H)
Psychiatrie infantile	(MICHAUX (L)
Stomologie	(CHAPUT (Mme A)
Thérapeutique	(BROUET chargé de l'enseignement



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41552418_0017

Urologie _____ KUSS (R)

III.- Professeurs HONORAIRES & AGREGES

RAPPELES A L'EXERCICE
(pour le service des examens)

MM. BRINDEAU (A) Obstétrique), GATELLIER (J) (Clinique chirurgicale), LE LORET (V) (Obstétrique), VAUDESCAL (R) Obstétrique).

IV.- PROFESSEURS SANS CHAIRE ET AGREGES

CHARGES DE COURS DE CLINIQUE ANNEXE
à titre permanent

MM.

Clinique chirurgicale _____	(AMALINE (A) (MENEGAUX (G) (PATEL (J) (SICARD (A) (BOULIN (R) (BROUET (G) (CACHERA (R) (DELARUE (A) (Garcin (J) (HAGUENEAU (M) (LENEGRE (J) (MARCHAL (G) (SOULIE (E) (DIGONNET (L) (EGALLE (G) (SUREAU (M) (RENARD (G) (COUVELAIRE (R)
Clinique médicale _____	
Clinique obstétricale _____	
Clinique ophtalmologique _____	
Clinique urologique _____	

--:-

MM.

Secrétaire de la Faculté _____	MOREL (J)
Secrétaire - Adjoint _____	Mle CHAINTREUIL (G)

--:-

Bibliothécaire en chef _____	Docteur HAHN (A) (M ^{mes} DUMAITRE (P) (GOICHON (A M) (LAURENT (H) (LE NOIR (G)
Bibliothécaires _____	

--:-

Par délibération en date du 9 Décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

A mes Grands Parents,

in memoriam

A ma Mère,

A mon Père,

Qui sont pour moi un vivant exemple
de droiture et de courage.

Qu'ils trouvent ici l'expression de ma
profonde affection et de ma
reconnaissance

MEIS ET AMICIS

A mes Maîtres d'Externat :

Monsieur le Docteur DELATTRE,

Monsieur le Docteur VILDE,

Monsieur le Docteur HANNEDOUCHE,

Monsieur le Docteur JACQUINET,

Monsieur le Docteur DUBOIS de MONTREYNAUD.

A mes Maîtres d'Internat,

Monsieur le Docteur HANNEDOUCHE,

Monsieur le Docteur DELATTRE,

Monsieur le Docteur BILLARD,

Monsieur le Docteur JACQUINET.

A mon Maître,

Monsieur le Docteur Raoul DELATTRE,

Oto-rhino-laryngologiste des Hôpitaux de Reims,

A qui nous devons le sujet de cette
thèse qu'il a inspirée et dirigée.

Qu'il nous soit permis de le remercier
ici de la bienveillante attention
qu'il n'a cessé de manifester à notre
égard, et de l'assurer de notre
respectueux attachement.

A notre Président de Thèse,

Monsieur le Professeur AUBIN,

Professeur de la chaire d'Oto-Rhino-
Laryngologie de la Faculté de Médecine
de Paris,

Oto-Rhino-Laryngologiste de l'Hôpital
Lariboisière,

Oto-Rhino-Laryngologiste de l'Hôpital
Pasteur,

Officier de la Légion d'Honneur,
Croix de Guerre,

Qui nous a fait le grand honneur
d'accepter la présidence de
cette thèse,

Qu'il trouve ici l'expression de
notre gratitude.

ESSAI SUR LE CORYZA

-:-

DEFINITION DU BORYZA

Sous le terme de Rhume de cerveau, on englobe souvent toutes les reactions de la muqueuse nasale, qui se manifestent par un écoulement séreux, muqueux ou purulent, et l'on confond souvent une rhinite hydrorrhéique, maladie de sensibilisation, avec le coryza, maladie infectieuse due la plus souvent à un virus.

C'est uniquement cette maladie qui sera le sujet de notre étude.

I°- Importance et conséquences.

Cette affection apparait des plus banales, mais sa bénignité n'est pas aussi réelle qu'on le croit généralement.

D'une part, c'est une maladie extraordinairement fréquente, récidivante (elle ne confère en effet aucune immunité) et fort désagréable, surtout pour certains sujets particulièrement réceptifs, et qui sont nombreux.

D'autre part elle peut se révéler sérieuse par les complications locales et générales dont elle peut être responsable

L'infection partie du nez peut intéresser les sinus, l'oreille ; elle peut se propager au pharynx, d'où douleurs et toux, au larynx, prolongeant ainsi la durée du rhume.

A un degré de plus, elle gagne les voies aériennes inférieures. Il apparait de plus en plus que le rhume banal joue un rôle important dans la pathogénie des affections respiratoires à pyogènes, et même dans certaines affections générales où le germe pénètre dans l'organisme

par les voies respiratoires.

Le rhume favorise l'infection par un double mécanisme (RIVOIRE) :

a/ Il réalise un certain degré d'anergie : l'individu devient alors réceptif vis à vis d'une affection minime.

b/ Il y a exaltation de la virulence de certains microbes, qui normalement saprophytes du naso-pharynx, deviennent accidentellement pathogènes : ce sont le streptocoque hémolytique, le pneumocoque, le bacille de PFEIFFER, ou de FRIEDLANDER.

Enfin dans certains cas heureusement rares, le virus peut déterminer une névraxite, une méningo-encéphalite mortelle.

2°- Conséquences économiques.

Sur le plan social, les conséquences sont graves. D'après la Metropolitan Life Insurance, la rhinite cause chaque année au peuple américain une dépense de un milliard de dollars.

Chaque individu a au moins deux rhumes par an, ce qui fait 300 millions de rhumes pour la totalité des Américains. En admettant que chaque rhume entraîne cinq jours d'indisposition, dont un jour de perdu par salarié, soit au total soixante huit millions de journées de travail perdues pour l'industrie.

A raison de sept dollars par jour, cela fait 476 millions de dollars par an.

En ajoutant le montant des frais médicaux, qui s'élèvent approximativement à 400 millions de dollars, et la perte sur la production, le total atteint bien le milliard de dollars enregistré par les statistiques américaines.

Ce qui est vrai pour l'Amérique, l'est aussi pour la France ; le nombre des journées de travail perdues par le fait de cette maladie est considérable, et probablement aussi important qu'en Amérique sur une échelle moindre, ce qui a des conséquences économiques sérieuses.

Il semble bien qu'on se soit préoccupé jusqu'ici de mettre tout en oeuvre pour réaliser une prophylaxie efficace contre une affection qui coûte cher à la nation, et frappe l'individu parfois sévèrement.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

ETUDE ETIOLOGIQUE

CONDITIONS DE SURVENUE DU RHUME DE CERVEAU. CIRCONSTANCES FAVORISANTES.

C'est dans les régions tempérées et humides que le coryza est le plus fréquent et récidive le plus souvent. Mais les pays nordiques ne sont pas plus touchés.

Les mauvaises habitudes que nous avons prises, notre hygiène défectueuse favorisent l'éclosion de cette maladie.

Le chauffage excessif des maisons, et de la pièce où l'on se tient habituellement, la mode qui veut que les enfants portent des pull-overs en laine, souvent à col montant, le port du cache-nez, l'habitude de mouiller les cheveux des adolescents pour des raisons de coquetterie, tout cela crée des conditions favorables à l'éclosion du coryza, chez des sujets météorosensibles.

Cette météorosensibilité, que nous allons exposer un peu plus loin, est la grande responsable du coryza, maladie infectieuse due à un ou plusieurs virus filtrants, qui favorisent le développement des germes banaux de la suppuration, qui seront à l'origine de la plupart des complications.

ETUDE BACTERIOLOGIQUE.

Nous avons dit plus haut que le coryza était dû à un germe pathogène appartenant au groupe des virus filtrants. Avant d'arriver à cette conclusion, de nombreuses recherches ont été entreprises par des expérimentateurs nombreux.

Au départ, la recherche est malaisée, compliquée, du fait de l'existence dans la naso-pharynx d'une flore saprophyte complexe, rendant très difficile l'explora-

tion biologique de cette région. Il était en effet tentant d'attribuer à l'un quelconque de ces germes le rôle déterminant, sous prétexte qu'il dominait le tableau bactériologique au cours d'un rhume banal, alors qu'en réalité cette prédominance signe le développement d'une affection secondaire.

C'est ainsi que successivement, au fur et à mesure des recherches, le micrococcus catarrhalis, le bacillus influenzae, le streptocoque, le pneumocoque, le bacillus rhinitis, furent incriminés comme responsables du coryza.

Puis, les travaux se poursuivent sur des bases plus scientifiques, notamment en Amérique où la création d'un prix de six mille dollars semble avoir exalté l'activité des bactériologistes. Les techniques courantes n'ayant pas réussi à mettre en évidence un agent étiologique du groupe des bactéries ordinaires, l'effort de ceux-ci se dirige vers la découverte d'un virus filtrant.

Les recherches remontent à une trentaine d'années, avant d'aboutir à cette hypothèse :

- en 1914 : W.KRUSE injecte dans les narines de volontaires des filtrants de sécrétions nasales recueillies sur des malades atteints de rhume de cerveau.

Il réussit à provoquer des coryzas expérimentaux. Sur une trentaine d'inoculations, il obtient 42 % de résultats positifs.

- en 1916 : FOSTER également réussit à produire des rhumes expérimentaux. Mais il introduit une nouveauté en cultivant le filtrat sur milieu au sang et en anaérobie. La culture se montre positive dans plusieurs cas, et il met ainsi en évidence de minuscules bacilles GRAM -.

Pour lui, ce germe filtrable serait le virus pathogène du coryza.

- en 1922, OLITZKY et GATES retrouvent ce bacille. Leurs travaux confirment l'opinion de FOSTER.

- Quelques années plus tard, SHIBEY, MILLS, DOCHEZ publient le premier travail véritablement scientifique qui ait été effectué sur cette question.

Dans une première étape, ils étudient la flore microbienne normale de la gorge et du nez, et ses variations au cours du coryza.

La conclusion de cette étude est qu'aucun germe pathogène (streptocoque hémolytique, staphylocoque, pneumocoque, cocci GRAM-) n'est responsable du coryza.

L'origine microbienne étant ainsi écartée, ils orientent leurs recherches vers la découverte d'un virus filtrant, comme le firent leurs prédécesseurs. Mais quel va être leur matériel d'expérience ?

Expérimenter sur l'homme était difficilement réalisable. Ayant entendu dire que les singes anthropoïdes contractaient facilement le rhume de cerveau, ressemblant en tous points au coryza de l'homme, ce fut donc à ceux-ci qu'ils s'adressèrent.

Ils rassemblent une colonie de chimpanzés et commencent leurs recherches. Aussitôt se trouve confirmée la sensibilité extrême des chimpanzés vis-à-vis de l'infection humaine : il suffit que le garçon de laboratoire chargé de leur nourriture soit enrhumé, pour qu'une épidémie se déclare dans la colonie, même si ce garçon se protège avec un masque de gaze. Contagiosité et tableau clinique sont identiques à ce qui se passe chez l'homme.

Avant de poursuivre, notons que la flore saprophyte du naso-pharynx est rigoureusement semblable

chez le singe anthropoïde et chez l'homme. Les conditions les meilleures se trouvaient donc réalisées pour permettre l'étude expérimentale de la maladie.

Chaque singe est d'abord placé en observation : isolement dans une cage spéciale, stérilisation de la cage, et même de la nourriture, aseptie rigoureuse pour tout contact avec eux. Rien ne se passe.

A la fin de cette période d'observation préliminaire, le singe est inoculé avec du bouillon préalablement stérile, ayant ensuite été utilisé pour laver le nez et l'arrière gorge d'un homme atteint de rhume récent. Le bouillon ainsi infecté passe rapidement à travers un filtre BERKEFELD V, et aussitôt après il est installé dans les narines du singe.

Vingt instillations furent ainsi pratiquées, dont quatre annulées parce que de résultat discutable. Parmi les seize autres, sept résultats positifs, ce qui donne un pourcentage de 44 %.

Ces rhumes expérimentaux sont semblables aux rhumes spontanés, en ce qui concerne la symptomatologie, la contagiosité, la période d'immunité de trois à quatre mois qui s'installe après eux, l'existence d'une flore saprophyte-pathogène, envahissant dans l'un et dans l'autre cas, la muqueuse naso-pharyngienne.

Après ces expériences concluantes, les auteurs reprirent les essais de transmission d'homme à homme, et opérèrent suivant la même technique. Ils obtinrent des résultats positifs dans la même proportion que chez les singes.

S'agissait-il du micro-bacille anaérobie de OLITZKY et GATES ? Ou d'un véritable virus filtrant ? Poursuivant leurs travaux, SHIBLEY, MILLS, et DOCHEZ et plus récemment LONG et DAULL, conclurent finalement et d'une

manière indéniable que le micro-bacille d'OLITZKY et GATES n'était qu'un vulgaire saprophyte, n'ayant d'autre caractère particulier que sa filtrabilité.

- en 1946, REDATTU, dans le Journal de Médecine de LYON, apporte des précisions concernant le fameux virus.

Il traverse les filtres BERKEFELD. Il est inactivé par un court séjour à 56°, mais peut être conservé pendant quinze jours à basse température en anaérobiose. Son activité persiste quatre mois au moins, après congélation et dessiccation dans le vide.

On a discuté les rapports de ce virus avec celui de l'influenzae. Quelques auteurs ont trouvé des différences : le virus du rhume ne serait pas pathogène pour le furet, et ne pourrait cultiver qu'en anaérobiose. Mais tous deux ont la même propriété de contagiosité, et de favoriser le développement de bactéries banales.

FACTEURS INDIVIDUELS

Mais le virus ne serait rien dans la plupart des cas si la réceptivité du sujet n'était déterminée par toute une série de facteurs que nous allons étudier, et qui sont essentiels pour que l'immunité vis-à-vis du virus filtrant disparaisse brusquement.

Ne fait pas du coryza qui veut. Certains sujets sont absolument réfractaires pendant toute leur existence, soit en raison d'une immunité acquise, ce qui est peu probable, étant donné ce que nous savons de la virulence de cette affection, soit plutôt du fait de leur terrain, de leur stabilité humorale.

D'autres au contraire font des coryzas à répétition. La moindre variation de température, de

l'hygrométrie, déclanche la maladie, comme un changement dans les habitudes vestimentaires ou dans l'habitat.

- Tel sujet qui a l'habitude de porter des cols hauts, ne peut plus porter des cols bas.

- Tel autre qui a l'habitude du col souple ne pourra plus porter un col glacé.

- Celui-ci habitué à porter un gilet de coton à manches, ne pourra jamais supprimer les manches, sans que l'éternuement fatal ne se déclanche, préluant à la rhinite infectieuse.

- Cet autre encore, sortant d'un établissement de douches, et ayant oublié son béret, se mit aussitôt à éternuer.

Tous ces sujets météoro-sensibles, que sont-ils ? Comment le deviennent-ils ? Qu'est-ce au fond que cette météoro-sensibilité, qui a été si bien étudié par MOURIQUAND, et d'autres auteurs ?

Avant de la décrire, nous croyons utile de préciser ce qui l'engendre. C'est alors qu'apparaît le :

ROLE DU TERRAIN

En effet, les variations météorologiques ne sont pas pathogènes pour tous les organismes. Les uns sont météoro-stables, météoro-résistants, et échappent généralement à leur action.

Les autres au contraire, comme nous venons de le dire avec MOURIQUAND, sont météorolabiles ou météoro-sensibles.

Les causes de cette sensibilité ne sont pas toujours précisées, mais souvent celle-ci paraît liée à une hérédité, et dans la plupart des cas, à un petit hépatisme héréditaire ou acquis. Selon nous, elle serait due à une

perturbation, à un déséquilibre de la vaso-motricité régie par le sympathique, à une certaine labilité vaso-motrice, engendrée souvent par une toxémie, une "focale infection", qui dérègle tous le mécanisme vaso-moteur par une série d'actions complexes.

Le sujet météoro-sensible est un nerveux, c'est un neuro-arthritique, nous dirons même un neuro-hépatique, un intoxiqué le plus souvent, un sujet dont le tube digestif fonctionne mal, le foie accomplit mal sa fonction anti-toxique :

- des albumines hétérogènes ayant des propriétés toxiques, sont mal dégradées ;

- si la fonction glycogénique se fait mal, il persiste des substances toxiques, qui normalement se combinent au glucose d'origine hépatique pour donner des glycuronates peut toxiques, qui sont éliminés par le rein.

Les diverses manifestations d'insuffisance hépatique peuvent être rattachées à une auto-intoxication, liée elle-même à la fonction glycogénique, qui domine toute la physiologie du foie.

Les toxines d'origine intestinale agissent aussi, modifient le terrain de l'individu, l'arthritisent, font de lui un "allergic man", un vago-sympathique, un intolérant, un coëloïdo-clasique, dont les centres qui règlent la vaso-motricité deviennent particulièrement sensibles à de multiples influences.

Et l'on pourra voir alterner chez lui différentes formes de maladies par sensibilisation : asthme, urticaire, eczéma, poussée articulaire, migraines, prurit, coryza spasmodiques, etc.....

METEORO-PATHOLOGIE

Déjà HIPPOCRATE, dans son traité des Airs, des Eaux, et des Lieux, attribue aux modifications de l'atmosphère, telles qu'elles se produisent à travers les saisons et les climats, une action prépondérante. Il recommande l'étude de la météorologie pour trouver l'origine des maladies.

Les sujets météoro-sensibles, météorolabiles de MOURIQUAND, précédemment définis, sont sensibles à l'action du champ électrique, à l'ionisation de l'atmosphère, au magnétisme terrestre, aux rayons cosmiques et telluriques. Ils enregistrent les changements de temps avant la météo, par des phénomènes de précession clinique, qui consistent en douleurs articulaires ou rhinites vasomotrices par exemple.

Ils sont sensibles aux variations barométriques, hygrométriques, au rayonnement solaire, à l'intensité des vents, à la température.

C'est ainsi qu'un choc hémoclasique, dont nous allons nous entretenir un peu plus loin, peut être déclanché par le froid, les rayons X, les ultraviolets, chez certains sujets sensibilisés.

- On a vu (René BENARD) de véritables chocs provoqués chez certains malades prédisposés, par des séances de radiothérapie.

- A titre expérimental (MORAT), un grand colloïdo-clasique, urticarien, déséquilibré endocrino-neuro-tonique, fit un choc en passant dans un solénoïde. Tout ceci pour montrer quelle influence peuvent exercer des champs électro-magnétiques sur des sujets prédisposés. Au contraire chez l'individu sain, rien de semblable ne se produit.

Rôle expérimental du Froid :

Le rôle des saisons, du froid, de la lumière, de l'électricité atmosphérique, a été bien étudié par les Allemands vers l'année 1933.

La plupart des auteurs admettent en ce qui concerne la météoro-pathologie, qu'il existe de véritables saisons biologiques. Quel est le facteur climatique, qui produit les recrudescences pathologiques ? Agit-il en augmentant la virulence microbienne, ou en créant une prédisposition organique ? La deuxième hypothèse semble la plus vraisemblable.

SCHMIDT et KAIRIES ont cherché à préciser le rôle du froid en étudiant scientifiquement son action sur le catarrhe des voies aériennes supérieures. Les expériences ont porté sur un grand nombre de sujets, dont on refroidissait l'organisme soit par ventilation de la peau, soit par un bain froid, soit surtout par inhalation d'air froid. Lorsqu'un sujet quelconque est resté longtemps exposé au froid, il se produit une vasoconstriction des vaisseaux de la peau, et surtout des muqueuses respiratoires. Chez la plupart des sujets, ces troubles circulatoires s'amendent très vite. Chez un dixième d'entre eux, la muqueuse ne se réchauffe pas, et réagit très fortement au froid. Dès que la réaction ischémique persiste plus de vingt minutes, il y a défaut de régulation thermique, et dès lors, augmentation possible de virulence, des microbes saprophytes, qui produiront le catarrhe. D'où le rôle primordial d'une prédisposition innée ou acquise.

VON DEN VELDEN a pu dire très justement que les sujets sensibles ne sont pas malades parce qu'ils ont un refroidissement, mais qu'ils ont un refroidissement parce qu'ils sont malades. (RAVINA)

Quelques exemples de malades :

- souvent froid et humidité s'associent. Ils ont le nez bouché, dans un rez-de-chaussée humide, mais libre au premier étage ;

- ils ne peuvent se promener le soir au bord d'une rivière sans éternuer.

- ils seront enrhumés en traversant une vallée et retrouveront leur voix quand ils auront quitté la vallée.

- ils éternuent dans une rue humide, au saut du lit, après un repas copieux ou alcoolisé.

- Les variations du milieu déterminent chez eux un déséquilibre de la vaso-motricité. Le froid devient un allergène qui sera responsable de la maladie coryzaïque, en déterminant un choc hémoclasique, un bouleversement humoral, qui va pour un temps, faire disparaître l'immunité naturelle contre le virus filtrant qui se trouve dans les fosses nasales.

Tâchons de pénétrer le mécanisme intime du choc déterminant :

L'individu entre en rapport avec le monde extérieur par les organes des sens et le tégument cutané ; la peau est une zone réflexogène importante comme les muqueuses. Chez l'allergique, le micro-sensible, tout se passe comme si la peau était devenu hypersensible, enregistre la moindre variation du milieu extérieur. Cette variation détermine une crise de vaso-contriction en un point variable de tégument. (Souvent la nuque) Au niveau de cette zone de peau glacée, refroidie par le spasme vasculaire, il y a libération d'histamine, qui passe dans le sang, et détermine un choc histamique, qui va déclencher une crise de coryza spasmodique, ou un coryza banal. Il

s'agit donc d'allergie physique, chez un sujet qui est souvent un "allergic man".

Le nez devient l'organe de choc ;

Nous savons bien que le mécanisme de l'allergie physique est encore très discuté.

La sensibilisation s'établit lentement, une année quelquefois.

Pasteur Valéry RADOT, dans sons Précis des Maladies Allergiques, l'explique ainsi :

1°- Dans l'allergie physique, il est vraisemblable qu'il y a libération d'histamine.

2°- Des troubles vaso-moteurs seraient suffisants pour la libération d'histamine.

3°- Pasteur Valéry RADOT pense comme nous à une crise colloïdo-clasique, dans l'allergie au froid. Mais pourquoi y a-t-il libération d'histamine au niveau de la peau ?

- DUKE pense que sous l'effet d'une cause physique, il se développe dans les tissus une substance semblable aux agrégats de molécules protéiniques, qui se forment quand les protéines de l'organisme sont soumises in vitro à l'une de ces causes. Cette substance de constitution physico-chimique particulière agirait comme un antigène hétérogène.

- Pour RAJKA, SULZBERGER, le froid, la lumière solaire, la chaleur, agirait comme de véritables antigènes, et produiraient des anti-corps dans l'organisme.

Que va-t-il se passer chez le coryzaïque? L'antigène (agrégts de molécules protéimiques pour DUKE, froid pour RAJKA et SULZBERGER) provoque la formation d'anticorps en circulation dans les humeurs. Ceux-ci vont se fixer en partie sur un organe, un tissu : la muqueuse

nasale dans le cas considéré, le nez devenant l'organe de choc.

On peut supposer qu'au moment où l'antigène sera de nouveau en contact avec l'organisme, le conflit antigène-anticorps, tant dans les humeurs que dans l'organe sensibilisé, provoquera un choc qui mettra en liberté l'histamine.

En 1927, BEST et DALE démontrèrent que l'histamine existe sous un état préformé comme constituant normal des cellules vivantes.

LEWIS, la même année, a montré que toute agression cellulaire pouvait libérer dans les cellules épidermiques une substance semblable à l'histamine, et il concluait que les réactions allergiques de la peau libéraient de l'histamine.

La décharge d'histamine au niveau de la muqueuse nasale, secondaire au conflit antigène-anticorps, provoque trois sortes de manifestations, associées ou isolées (Pasteur Valéry RADOT).

- 1° spasme des muscles lisses
 - 2° augmentation de la perméabilité capillaire, d'où vaso-dilatation suivie d'œdème.
 - 3° hypersécrétion des glandes muqueuses
- que nous retrouverons dans la symptomatologie du rhume de cerveau.

LE RHUME.

Nous pensons avoir démontré suffisamment que le terrain est tout. Le coryzaïque est un "allergique man" chez lequel on voit se succéder ou alterner coryza spasmodique et rhume de cerveau. C'est le type de l'allergie physique et l'organe de choc est le nez. Il fait quelquefois de l'allergie cutanée. En tout cas, sa peau hyperson-

sible à toutes les variations du milieu extérieur, à toutes les variations atmosphériques, libèrent de l'histamine, dès que une zone de tégument cutané est le siège d'une crise vaso-motrice, et certaines zones de la peau sont particulièrement sensibles chez certains sujets. On pourrait même parler de sensibilisation locale, car tel sujet qui fait une crise vaso-motrice quand il a les bras nus ou la nuque découverte, ne la fera pas si ses membres inférieurs sont à l'air.

Le virus n'entre en scène que lorsque le conflit antigène-anticorps se produit dans les humeurs et au niveau de l'organe de choc, c'est-à-dire le nez, quand la crise colloïde+clasique ou si l'on veut le choc histaminique, s'est déclanché.

A ce moment, l'immunité du sujet n'existe plus, le virus devient virulent, et le rhume commence.

Le sujet frissonne, a une sensation de malaise indéfinissable, de chaleur ou de froid, il éternue. Il y a une augmentation de la perméabilité capillaire, au niveau de la muqueuse nasale, ce qui engendre vaso-dilatation et oedème, et une hypersecretion des glandes muqueuses.

Un écoulement muqueux se produit, comme dans le coryza spasmodique, et l'obstruction nasale se produit par turgescence des cornets inférieurs.

Une sensation de fatigue accompagne un léger état fébrile qui va s'accroître les deuxième et troisième jours, quand le virus laisse les bactéries banales se développer, et produire la suppuration nasale qui va durer quelques jours.

Puis tout rentre dans l'ordre ; si aucune complication ne survient.

Mais ces complications sont fréquentes, pouvant intéresser les sinus, l'oreille, le pharynx, le

larynx, et les voies aériennes inférieures.

LES RHINO - PHARYNGITES DE L'ENFANT

Chez l'enfant, les affections des voies aériennes supérieures sont extrêmement fréquentes. Nous retrouverons les mêmes sujets météoro-labiles que chez l'adulte ; ils sont de plus, pour la plupart d'entre eux, des "inadaptés urbains". (MOURIQUAND et JOSSERAND)

On retrouve souvent dans l'ascendance et les collatéraux de ces enfants neuro-labiles, des éléments de la diathèse neuro-arthritique (migraines, asthme, goutte).

L'enfant lui-même peut présenter une insuffisance hépatique se manifestant par de l'eczéma, des intolérances alimentaires, plus tard par des crises d'asthme, des vomissements acétonémiques.

Les troubles nutritifs, la convalescence de maladies infectieuses favorisent les accidents météoropathologiques, en mettant l'organisme en moindre état de résistance.

Cette prédisposition malade spéciale qui peut être l'expression d'une disposition héréditaire, de même qu'elle peut être provoquée par l'action du milieu dans lequel vit l'enfant, a été baptisée par CZERNY "diathèse exsudative". Dans ce cadre entrerait le groupe des enfants atteints d'eczéma, d'asthme, de prédispositions spéciales pour les catarrhes muqueux récidivants, de même que les enfants sujets aux engorgements du système lymphatique.

Pour ces derniers, on a créé le mot de "status thymo-lymphaticus" dont on ne parle plus guère aujourd'hui.

Sur ce terrain ainsi défini, comment va-se présenter l'affection ?

Il n'y aura plus ici rhinite simple, mais rhino-pharyngite.

Le point de départ sera l'amygdale pharyngée de LUSHKA, l'amygdale palatine ne semblant pas intervenir. La rhinite succède-t-elle à l'atteinte du pharynx, ou lui est-elle concomitante ?

Il est difficile d'y répondre.

Fréquemment, chez ces enfants prédisposés, l'amygdale pharyngée s'hypertrophie, donnant naissance aux végétations adénoïdes. Celles-ci vont entraîner une gêne respiratoire des troubles nutritifs, de la toux, et vont entretenir une infection chronique du cavum.

Ces rhino-pharyngites à répétition pouvant s'accompagner d'une fièvre assez élevée, sont une maladie aussi pénible, sinon de la même façon, pour l'enfant que pour les parents.

L'enfant est agité, grognon, le plus souvent anorexique, le nez est obstrué. L'examen du pharynx montre une muqueuse rouge, luisante, couverte de mucopus, qui tombe du cavum.

Elles se compliquent très souvent d'otites aiguës par voie tubaire.

L'infection des voies aériennes inférieures est plus rare : bronchites, broncho-pneumonies aiguës, de même que méningites et encéphalites.

Chez le nouveau né, le coryza aigu est le type des maladies à frigore.

Il survient fréquemment lors d'un refroidissement causé par un bain, des soins de propreté, ou après une exposition prolongée au soleil. Le nourrisson en effet

ESSAI DE THERAPEUTIQUE

TRAITEMENT LOCAL

1°- Comment réaliser la prophylaxie à chaud ?

On peut toujours faire avorter un coryza dans les premières heures en réchauffant le malade, c'est-à-dire en lui faisant prendre un bain très chaud, ou en réchauffement systématique des pieds et de la nuque ; et si l'on ajoute à ce traitement la prise d'antihistaminiques, on fait avorter le rhume dans 90 % des cas.

Surtout si l'on ajoute à ce traitement général des instillations d'auréomycine ou de tifomycine.

2°- Si le rhume évolue, que faire ?

Rappelons qu'il est dû à un virus filtrant, donc tous les antiseptiques sont inutiles, et même souvent nuisibles, car ils altèrent les cils vibratiles de la muqueuse, et le mucus bactéricide.

Tout au plus convient-il d'assurer une perméabilité nasale suffisante, par des préparations à base d'éphédrine, qui permettent un drainage des fosses nasales.

Certaines spécialités dans lesquelles rentre de la belladone sont fort utiles, car elles diminuent les sécrétions et assurent une bonne respiration nasale.

Localement on a essayé tous les vasoconstricteurs possibles : adrénaline, cocaïne, éphédrine, ou une association des trois.

Mais on connaît les inconvénients de l'adrénaline, par les effets secondaires qu'elle développe, de la cocaïne, par les dangers d'accoutumance.

On devra également s'abstenir de pratiquer des lavages des fosses nasales le liquide injecté pouvant servir de véhicule aux microbes virulents, et les transporter, soit vers les trompes, d'où otite, soit vers les sinus, d'où sinusite.

Les inhalations seront proscrites au début, car elles risquent de produire une congestion des muqueuses, qui sont déjà hyperhémisées.

Il faudra toujours conseiller au malade de moucher alternativement l'une et l'autre des fosses nasales avec douceur, et seulement quand l'obstruction sera levée temporairement par l'éphédrine.

Il est également recommandé d'éviter d'éternuer, car un malencontreux éternuement suffit à réveiller une crise. En conséquence, dès qu'on sent le picotement nasal avertisseur :

- fermer les yeux,
- respirer par la bouche,
- relever fortement le lobule du nez en pressant sous la sous-cloison : procédé recommandé jadis à la Cour d'Angleterre, où il n'était pas correct d'éternuer en présence de la Reine (MARCOLE LERMOYEZ).

TRAITEMENT GÉNÉRAL

C'est à la fois un traitement prophylactique et curatif.

I°- Traitement par les agents physiques.

Puisque le terrain joue un rôle primordial, il faut donc s'efforcer de le modifier.

Et puisqu'il s'agit d'allergie physique, il faut donc accroître la résistance du sujet contre le froid.

Vitaminotherapie.

La vitamine C chez tous les allergiques modifierait favorablement le terrain. Chez les enfants, les vitamines A et D pourront améliorer considérablement les rhinites et les rhino-pharyngites à répétition.

Action sur les affections focales.



































Il faudra penser aux allergènes endogènes élaborés par l'organisme lui-même ou par les bactéries qui s'y trouvent. Les infections focales seront recherchées : les infections dentaires, sinusiennes, amygdaliennes, seront traitées comme il convient.

On fera dans ce cas appel au chirurgien toutes les fois qu'il sera nécessaire, toute thérapeutique médicale restant inefficace, tant que le foyer infectieux ne sera pas détruit.

Traitement de l'arthritisme.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were incubated with the plant explants for 24 h. The explants were then cultured on the selective medium. The number of explants transformed was counted. The results are expressed as the mean $\pm$ SD of three independent experiments. The scale of the y-axis is 10³.

L'insuffisance hépato-digestive est la grande responsable du moderne arthritisme. Il est certain que chez tous les coryzaïques ou à peu près, il existe des signes d'insuffisance hépatique.

Le traitement consistera surtout en un régime équilibré, et une hygiène bien comprise.

On stimulera les fonctions hépato- digestives, on s'efforcera de corriger les troubles intestinaux. Ces malades devront mener une vie normale : une activité nécessaire, seulement une activité excessive peut être aussi nuisible que la sédentarité.

Cette méthode donne de bons résultats, à condition de respecter l'intervalle d'une heure entre l'absorption de peptones et le repas, sans trop sortir de cette limite et sans rien absorber durant ce temps. La peptone sera administrée d'une façon continue ou discontinue, les résultats variant selon les sujets.

- Les injections de substances cristalloïdes ont été également employées.

a/ l'hyposulfite de soude intra-veineux préconisé par RAVAUT. Il n'est plus guère utilisé aujourd'hui.

b/ l'hyposulfite de magnésium par voie intra-musculaire ou intra-veineuse préconisée par LUMIERE, a des succès à son actif.

c/ le gluconate de calcium par voie veineuse donne de très beaux résultats.

Toutes ces substances agissent en provoquant un petit choc qui va préserver l'organisme pendant un certain temps, contre un autre choc spontané.

Toutes, elles modifient l'état humoral du sujet sensible. Un choc léger peut être également réalisé, nous l'avons vu, par un changement d'air, une cure d'altitude, un changement dans les habitudes, le retour à une vie plus calme.

La radiothérapie, la pyrététo-thérapie, la modification de l'équilibre acido-basique des humeurs, ont pu dans certains états allergiques donner de bons résultats.

2°- Histamine et anti-histaminiques

Puisqu'il est admis que l'histamine, comme la substance H de LEWIS, joue un rôle primordial dans l'apparition des syndrômes allergiques, il était tentant de désensibiliser le sujet vis-à-vis de cette substance.

- Mais les essais d'immunisation contre l'histamine n'ont pas donné de résultats. L'administration répétée de petites doses d'histamine n'a pas abouti à la désensibilisation.

- en 1929, BEST et Mac HENRY constatèrent la présence dans certains tissus normaux d'une diastase, l'histaminase, capable de détruire l'histamine.

On l'essaya pour neutraliser la production d'histamine, mais là encore les résultats n'ont pas été très probants.

- D'autres acides aminés furent essayés : histidine, arginine, cystéine, et certains dérivés de la guanidine.

Mais l'action anti-histaminique et anti-anaphylactique des amines naturelles ne se manifesta guère in vivo (FROMMELT).

- C'est alors que les anti-histaminiques entrent en scène :

a/ FOURNEAU et BOVET en 1933, ont démontré que certains corps synthétiques, appartenant à la série des phénoxy-éthyl-amine (929 F), ainsi que certains dérivés de l'éthylène-diamine (1571 F), sont doués de propriétés anti-histaminiques.

b/ Halpern en 1940 montra qu'un dérivé de l'aniline, le 2332 EP, était beaucoup moins toxique que les corps précédents, et beaucoup plus actif.

c/ BOVET en 1944 étudia un corps très voisin de l'antergan, dérivé de la pyridine, le 2786 EP, le néc-antergan.

d/ HALPERN récemment étudia une série de corps dérivés de la thio-diphényl-amino, en particulier le 3015 EP et le 3277 EP ou phénergan.

Ce dernier semble le plus actif de tous les

anti-histaminiques connus.

e/ la Théphorine, intéressante parce que dépourvue d'action hypnogène : peut être administrée dans la journée.

La pyribenzamine comparable au phénergan par l'intensité et la durée de son action semble cependant un peu moins bien tolérée que celui-ci.

L'antitistine est très bien tolérée, mais son action est moins énergique et moins prolongée que celle du phénergan.

f/ le dernier venu des anti-histaminiques, le Thiazinamium, ou 3554 RP ou Multergan est surtout utilisé dans l'asthme pour ses propriétés cholinergiques.

Utilisation dans le coryza.

Les premiers essais thérapeutiques dans le coryza banal furent effectués par DECOURT en 1943.

THIERS de LYON, peu de temps après, confirma l'action très nette de l'antergan sur le coryza.

Aux Etats-Unis, BREWSTER dès 1947 entreprit l'étude systématique de la thérapeutique du rhume de cerveau banal par les anti-histaminiques et obtint les résultats les plus encourageants.

Administrés à la phase initiale allergique du coryza, ils ont une activité maxima et contribuent ainsi à éviter les complications muco-purulentes.

3°- Immunité vaccinale

Anti-virus-thérapie

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Puisque le coryza est déterminé par un virus, il était logique de réaliser une vaccination contre cette

affection, comme pour toute autre maladie infectieuse.

FOX et LIVINGSTONE de Chicago, en 1949, étudièrent le fait que certains sujets pouvaient être désensibilisés avec succès par vaccination anti-virus grippal, l'effet de cette vaccination pouvant durer au moins six mois, pendant lesquels il y a disparition des rhumes.

L'immunisation active contre l'infection

bactérienne secondaire.

Elle fut essayée la première également par des Américains (KOLMER, RULE).

Ils expérimentèrent d'abord chez la souris. Puis sur des hommes adultes, ils provoquèrent la formation d'anticorps protecteurs, par administration orale de stock-vaccins bactériens polyvalents.

4°- Plantes anti-virus.

De nombreux végétaux supérieurs, manifestent des propriétés anti-bactériennes considérables. Récemment s'est dévoilé un aspect nouveau de ces propriétés antibiotiques des plantes supérieures : celui des plantes anti-virus.

Parmi les plantes reconnues actives, les familles des Saxifragacées, des Onogracées, des Primulacées, sont parmi les plus intéressantes.

Les plantes ornementales telles que les fuschia, le thé, la gale de chêne, le rhizôme de rathania, l'écorce de quinquina, la cannelle, le clou de girofle, les feuilles d'hamamélis, entre autres, possèdent une activité anti-virus certaine.

La question des principes actifs en cause n'a

coryzas se compliquent de catarrhe tubaire à tendance chronique.

Les eaux d'Allevard ou d'Ax-les-Thermes, si bien supportées, seront peut être plus indiquées s'il existe un élément spasmodique, ou si les muqueuses sont particulièrement irritables. Allevard est sédatif, décongestionnant, calmant. Il peut recevoir les spasmodiques.

Les eaux sulfureuses seront prohibées chez les malades hérétiques et excitables.

Les sujets chez lesquels on voit alterner les coryzas avec du coryza spasmodique et des pharyngo-laryngites, congestion avec spasme, avec tendance asthmatiforme, se trouveront bien des eaux indéterminées chaudes du Mont-Dore, bicarbonatées sodiques, ferrugineuses et arsenicales, nettement anti-arthritiques.

Les jeunes neuro-arthritiques, sujets à des crises rhino-pharyngo-laryngées, et à des pharyngo-trachéites à répétition, se trouveront parfaitement de la cure du Mont-Dore répétée, dont l'effet est calmant, décongestif, résolutif, sédatif.

La cure du Mont-Dore est désensibilisante, par la production de petits chocs répétés, sédatifs du système nerveux neuro-végétatif, régulatrice de l'équilibre endo-crinien.

Et la Bourboule, dont les eaux renferment 17 milligrammes d'arsenic par litre, verra venir vers elle les enfants pâles, anémiés, lymphatiques, atteints de coryza à réchauffement intermittent.

Ajoutons qu'elle est contre-indiquée pour les enfants congestifs et nerveux.

A l'effet de la cure au Mont-Dore et à la Bourboule, s'ajoute l'effet du climat d'altitude, puisque ces stations se trouvent à peu près à 1.000 Mètres.

Enfin, dans certains cas, où l'indication créno-thérapique est difficile à poser, on usera utilement des eaux sulfureuses et arsenicales de Saint-Honoré (Nièvre), si bien supportées par les nez et pharynx particulièrement sensibles, pour lesquels les eaux sulfureuses fortes (Cauterets ou Luchon) pourraient déterminer des crises thermales violentes. Saint-Honoré, tonique dans la note douce, sédatif, convient à des états constitutionnels mixtes.

Chez l'arthritique, les indications créno-thérapeutiques doivent être très nuancées, et si le soufre, grand modificateur du terrain, est en principe recommandé chez les coryzaïques, il faudra dans certains cas savoir utiliser les stations calmantes comme Saint-Honoré, Ax/et Allevard, alors que dans d'autres cas, Luchon, Cauterets seront très bien supportées, et donneront des résultats durables.

Dans certains cas, les cures alternées pourront être intéressantes, et c'est ainsi que les petits hépatiques pourront user alternativement des cures à Vichy et des cures sulfureuses.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

C O N C L U S I O N S

- : - : - : - : -

Nous sommes obligés de conclure qu'en dépit des progrès de la thérapeutique, aucun traitement, jusqu'à présent, ne permet de guérir un rhume de cerveau.

Le traitement local, nous l'avons vu, est illusoire.

La thérapeutique générale devra s'efforcer de modifier l'état constitutionnel du sujet, afin de le rendre moins réceptif, moins sensible vis-à-vis de cette affection.

Le coryza banal est certainement à son début une crise de rhinite allergique, le virus déterminant n'entrant en scène que secondairement.

Il sera donc logique de lutter contre cette allergie nasale.

Chez les enfants, le rôle de l'allergie serait particulièrement important dans le déclenchement des syndrômes respiratoires.

Tout récemment, DEBRÉ¹ a montré la place importante que tient l'allergie en Pédiatrie. Il insiste sur les rapports entre l'allergie et l'infection.

D'après lui 50 % des enfants souffrent ou ont souffert de manifestations dont la pathogénie allergique est très vraisemblable.

Il semble que le nombre des sujets réceptifs se soit considérablement accru depuis une cinquantaine d'années environ. Tous les enfants ont des rhino-pharyngites. Il est vraisemblable qu'une grosse part de responsabilité revienne à l'alcoolisme qui cause de plus en plus de ravages.

Ce grand nombre de sujets souffrant de

coryzas à répétition, que nous savons mal prévenir et guérir pose un véritable problème social.

Les anti-histaminiques agissent efficacement sur la phase allergique du début et sur le terrain.

Il serait souhaitable que les travaux scientifiques se poursuivent et mettent en évidence un corps ou un procédé, capable d'inhiber le virus responsable du coryza.

Peut être cet espoir sera-t-il réalisé par l'emploi des "plantes à tanin".

[illegible]

Vu :
Le Président de Thèse :
signé : AUBIN

Vu :
Le Doyen :
signé : BINET

Vu et Permis d'Imprimer
Le Recteur de L'Académie de Paris
signé : JEAN SARRAILH.



B I B L I O G R A P H I E
- : - : - : - : - : -

CHIRAY M. MOLLARD H. & MASCHAS H.

La climatologie de l'avenir
Revue méd. franç. Mai 1942

MISSENARD André

L'homme et le climat Paris 1937
Plon et Nourrit Editeurs.

MOURIQUAND Georges

Répercussions médicales liées aux météorologiques.
Presse Médicale 25 Juillet 1934

MORICQUAND & JOSSERAND P.

Syndrômes météoro-pathologiques et
Inadaptés Urbains.
Masson 1935

RAVINA A.

La météoro-pathologie, influence des saisons,
du froid et du manque de lumière sur l'organisme.
Presse Médicale Mai 1935

WORINGER P.

Les influences saisonnières sur les maladies
Presse Médicale Juillet 1934

JOLTRAIN Ed. MORAT D. & DELHERNE L.

Influence des champs électro-magnétique sur
l'équilibre humoral.
Presse Médicale Mai 1936

LAIGNEL-LAVASTINE

Introduction à l'étude du sympathique et des climats.

Monde Médical Juin 1937

LUMIERE A.

La théorie colloïde de la vie et de la maladie.
Lyon 1925 Sézanne Ed.

HAUTANT A.

Allergie Nasale

TZANCK Arnault

Immunité. Intolérance. Anaphylaxie.
Doctrines biologique et Médecine Expérimentale.
Masson 1932.

PASTEUR VALLERY RADOT

Précis des maladies allergiques.
Ed. méd. Flammarion 1949

DEBIDOUR A.

L'hydrothérapie : méthodes d'immunisation contre
les affections des organes respiratoires déclan-
chés par le froid.
Journal méd. franç. Tome XIV n° 3 Mars 1925

WEISSENBAACH R. J. & FRANCON F.

Hygiène des goutteux et des rhumatisants
1932

DEBRE R.

L'allergie en pédiatrie.
Presse médicale 1953 61 n° 10 p. 199

CATHALA J.

Les réactions d'intolérance chez les enfants
Presse Médicale 1950 - 58 n° 36 p. 629

BLAMOUTIER P.

Ier Congrès européen d'allergie
Paris 1950
La Presse Médicale 1.950 - 58 n° 53

KRUSE W.

Die ERREGER Vn Husten un Schnupfen
Münch. med. Wochen 1914 T. IX p. 154

FOSTER G.B.

The etiology of common colds, the probable role
of filtrable virus as causative factor.
The Journ. of the amer. med. ass.
15 Avril 1916 p. 1180

OLITSKY & GATES

Etiology of common colds
The Journ. of exper. med. Nov. 1922 p; 501

SHIBLEY J.S. MILLS K. CK. DOCHEZ A.R.

Studies of the etiology of the common cold.
The Journ. of the amer. med. ass.
Nov. 1930 p. 1553

LONG et DOULL

Etiology of acute upper respiratory infection
(common cold)
Proc; soc. exper-biology med.
Octobre 1930 n° 53

RIVOIRE R.

L'Étiologie du Rhume de Cerveau
La presse Médicale 7 Février 1931

REBATTU J. SOHIER TRENQUE P.

Le coryza aigu, son étiologie, sa nature.
Le journal de médecine de Lyon t. 27
n° 641, 20 sept. 1946 p. 641-647

FOX N. LIVINGSTON G.S.

Immunisation vaccinale contre le coryza banal.
Archives of Otolaryngology Chicago vol. 50,
n° 4, Oct. 1949 p. 406-416
Le rôle de l'allergie dans l'épidémiologie
du coryza banal.
Archives of Otolaryngology Chicago 49,
6 Juin 1949 p. 575-586

WALLGREN Arvid.

Le terrain de neurolabilité de l'enfance.
La Semaine des Hopitaux n° 52 Juil. 1948

BIEKEL G.

Considérations sur le traitement des syndrômes
d'hypersensibilité au froid.
Schweizerische medizinische Wochenschrift
n° 51, 24 Déc. 1948 p. 1260-1261

AUBRY M.

Le traitement du rhume de cerveau.
La presse médicale n° 15-16
18 - 21 Février 1942

HALPERN B.N.

Les antihismaniques de synthèse.

Arch. Int. Pharmacodynamie et Thérapie.

1942, 68, p. 339-408

VINCENT D.

Plantes antiviruses.

La Presse Médicale 21 Mars 1953

61, n° 20 p. 417

GREEN R.

Inhibition of multiplication of influenza virus
by extracts of Tea.

Proc. Soc. exp. Bid. Med. 1949 71-84

Inhibition of influenza virus by tannic acid.

Proc. Soc. exp. Bid. Med. 1948 67, 483

DESTENAY G.

Conséquences économiques du rhume de cerveau

La Semaine des Hopitaux.

6 Février 1950 n° 10, p. 439

